

Ihre Vorteile

➔ Bewährte Wirkstoffkombination

aus Florasulam, Clopyralid und Fluroxypyr, bekannt durch Ariane C

➔ Sichere Problemunkräuter-Bekämpfung

von Durchwuchskartoffeln, resistenter Kamille und Vogelmiere

➔ Breit wirksam gegen Unkräuter

inkl. Klatschmohn, Storchschnabel, Kamille, Knöterich-Arten, Distel-Arten und Klettenlabkraut

➔ Langer Anwendungszeitraum

von BBCH 13-39 (Winterungen) bzw. 13-30 (Sommerungen)

Produktvergleich

	zugel. Anwendungszeitraum (BBCH NAF)	max. zugel. Aufwandmenge in l bzw. kg/ha											zugelassen in									
			Ehrenpreis	Erdrauch	Kamille	Klatschmohn	Klettenlabkraut	Knöterich-Arten	Kornblume	Stiefmütterchen	Storchschnabel	Taubnessel	Winterungen				Sommerungen					
Kingston	13-39	1,0	○	●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	○	●●	●●	X	-	X	X	X	-	-	-	-	-
	13-30		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X							
Ariane C	13-39	1,5	○	●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	○	●●	●●	X	-	X	X	X	-	-	-	-	-
	13-30		-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X								
Biathlon 4D + Dash	13-39	0,07 + 1,0	●○	●●	●●●	●●●	●●●	●●○	●●●	●○	●○	●●	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Omnera LQM	21-39	1,0	●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●○	●●	●●●	●●●	X	-	X	X	X	-	X	-	X	-
	12-39		-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X								

●●● sehr gute Wirkung ●● gute Wirkung ● geringe Wirkung ○ Teilwirkung - keine Wirkung

Produktprofil

	Kingston
Wirkstoffe	80 g/l Clopyralid, 100 g/l Fluroxypyr, 2,5 g/l Florasulam
max. zugel. Aufwandmenge	1,0 l/ha
Anwendungszeitraum	Winterungen: BBCH 13-39, Sommerungen: BBCH 13-30
Zulassung	Winterweichweizen, Wintergerste, Wintertriticale, Winterroggen, Sommerweichweizen, Sommergerste, Sommerhafer
Verkaufsgebilde	5 l
HRAC-Gruppen	O, B (alt), 4, 2 (neu)
Auflagen (90 % Abdriftminderung)	Randstreifenbreite bei Hangneigung > 2 %: keine Gewässerabstand: länderspezifisch Nicht-Zielflächen: 5 m

Bitte beachten Sie in jedem Fall vor dem Einsatz aller Präparate die Gebrauchsanweisung! Alle Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt. Irrtum vorbehalten. Die Umsetzung erfolgt auf eigenes Risiko.

Anwendungsempfehlung


breite Mischverunkrautung in Sommergetreide



breite Mischverunkrautung in Wintergetreide



Spätbehandlung in Wintergetreide



BBCH-Stadium:

22

24

30

31

32

37

39