

PERFEKTER SCHUTZ DANK LANGEM ANWENDUNGSFENSTER



WIRKSTOFF

250 g/l Tebuconazol

FORMULIERUNG

Emulsionskonzentrat (EC)

WIRKSTOFFGRUPPE

FRAC-Gruppe: G1

KULTUREN

Raps, Weizen, Gerste

WIRKUNGSWEISE

DMI-Fungizid – systemisch;
vorbeugend, heilend, abstoppend

AUFWANDMENGE

Raps (Herbstanwendung): 0,5 l/ha
Raps (Frühjahrsanwendung): 1,0 l/ha
Weizen, Gerste: 1,0 l/ha

ANWENDUNGEN

Raps: BBCH 14 – 18 & 30 – 69,
max. 3 Anwendungen je Jahr,
max. 1 Anwendung im Herbst
Weizen, Gerste: ab Befallsbeginn
bis BBCH 71, max. 2 Anwendungen
je Kultur / Jahr

ABSTÄNDE

NW605, NW605-1, NW606, NW705

BIENEN

ungefährlich (B4)

MISCHBARKEIT

Gut mischbar

VERKAUFSGEBINDE

4 x 5 l/Karton

VORTEILE

- Zulassung in Raps und Getreide
- Wirkt gegen Blatt- und Ährenkrankheiten
- Optimal formuliert (EC)
- Langer Einsatzzeitraum im Raps

FEZAN® 71 ist ein breit wirksames Fungizid mit systemischer Wirkung in Raps und Getreide. Es wirkt sowohl vorbeugend (protektiv) als auch bei beginnendem Befall (kurativ) und hat eine Wirkungs-dauer von mehreren Wochen. Besonderheiten sind die optimierte Formulierung und die hohen Leistungsreserven bei gleichzeitig hervorragender Pflanzenverträglichkeit.

WIRKUNGSSPEKTRUM

Raps: Sclerotinia sclerotiorum, Cylindrosporium-Weißfleckigkeit (Cylindrosporium concentricum)


Weizen: Echter Mehltau (Erysiphe graminis), Braunrost (Puccinia recondita), Gelbrost (Puccinia striiformis), Fusarium-Arten (ausgenommen Hartweizen)

Gerste: Rhynchosporium secalis, Echter Mehltau (Erysiphe graminis)

i PRAXISTIPP

- Setzen Sie **FEZAN® 71** früh im Rahmen der zugelassenen Anwendung ein. Dabei werden auch Befallsnester von Gelbrost sicher erfasst (Zusatzwirkung) – der rechtzeitige Einsatz ist für eine gute Wirkung entscheidend!
- Die aktivierende Formulierung führt zu Wirkungsverstärkung in Tankmischungen.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG RAPS



ANWENDUNGSEMPFEHLUNG GETREIDE

